(*) **Soglie catture trappole Yf**
(adulti/ trappola x stagione)
A. brevis, 1 Anno prima> 210
A. brevis, 2 Anni prima> 450
A. sordidus, 1 Anno prima> 1100
A. ustulatus, 2 Anni prima> 1000

SEMINA MAIS COSA FARE?

PRESENZA FATTORI DI RISCHIO DI ATTACCO ELATERIDI
sostanza organica > 5%, cattivo drenaggio (es. sistemazione a cavino) , avvicendamento con copertura continua vegetale – prati, doppi raccolti (rischio basso se copertura da cover crops), attacchi precedenti, elevata presenza attorno di prati naturali o coltivati , elevate catture con trappole Yf*

NO FATTORI DI RISCHIO
DI ATTACCO DI ELATERIDI

ALTRI FATTORI DI RISCHIO

PRATO
come precessione

TRAPPOLE PER LARVE

Aratura autunnale

Aratura primaverile

Trappole sopra soglia

Trappole sotto soglia
< 1 larva/tr *A. brevis,*
< 2 l/tr *A. sordidus,*
< 5 l/tr *A. ustulatus, A. litigiosus*

Conferma mais

Spostamento coltura in appezzamento a basso rischio

Trattamento alla semina

NO TRATTAMENTI INSETTICIDI
(come concianti o geodisinfestanti)